

# ZASTOSOWANIE RANELINIANU STRONTU W LECZENIU OSTEARTROZY

V Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 20-21.09.2013

**Streszczenia:**

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2013, vol 15 (Suppl. 2).str 53-54

**L14**

## ZASTOSOWANIE RANELINIANU STRONTU W LECZENIU OSTEARTROZY

**E.Czerwiński<sup>1,2,3</sup>, M.Berwecka<sup>2</sup>, K.Boczoń<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Krakowskie Centrum Medyczne, Kopernika 32, 31-501 Kraków, [www.kcm.pl](http://www.kcm.pl)

<sup>2</sup>Zakład Chorób Kości i Stawów, WNZ, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

<sup>3</sup>Polskie Towarzystwo Osteoartrologii, Kopernika 32, 31-501 Kraków

### ***ranelinian strontu, osteoartroza, DMOAD, MRI***

Osteoartroza jest najczęstszą chorobą stawów. Po 65r.ż. dotyczy 68% kobiet i 58% mężczyzn. Niestety nadal nie dysponujemy lekiem, który wpływałby zarówno na dolegliwości (*SMDOAD – Symptom Modifying OA Drugs*), jak i na przebieg zmian osteoatrotycznych (