# Panniculitis

**Terapia 5/2004. Reumatologia**

Lek. med. Aleksandra Tuchocka-Piotrowska
*Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna*
*i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu*
*Kierownik:*
*prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska*

Terminem panniculitis określa się odczyn zapalny dotyczący tkanki tłuszczowej, najczęściej podskórnej, związany z martwicą komórek tłuszczowych. Zapalenie to może występować samodzielnie bądź współistnieć z uogólnionymi chorobami tkanki łącznej, zespołami limfoproliferacyjnymi, chorobami trzustki, nowotworami. Przyczyna choroby pozostaje do chwili obecnej nieznana. Zaobserwowano natomiast, iż pewne czynniki natury chemicznej, fizycznej, urazy mechaniczne, zaburzenia enzymatyczne i infekcje mogą stanowić tzw. element spustowy, inicjujący objawy panniculitis. Zapalenie tkanki tłuszczowej obserwowano m.in. po odstawieniu glikokortykosteroidów u dzieci, poza tym po wstrzyknięciu obcego białka podskórnie czy też u pacjentów z zaburzoną równowagą wapniowo-fosforanową w niewydolności nerek (1).

*Artykuł w pełnej wersji do pobrania w pliku pdf*

06_Panniculitis.pdfDownload