

# Problemy chorób zakrzepowo-zatorowych u kobiet

Terapia 2/2004. Zdrowie Kobiety

Dr hab. med. Maria Jastrzębska

*Samodzielna Pracownia Zaburzeń Hemostazy PAM w Szczecinie*

*Kierownik: dr hab. med. Maria Jastrzębska*

Głównymi czynnikami choroby zakrzepowej są zmiany w ścianie naczyniowej, zaburzenia w przepływie krwi oraz zmiany w składzie krwi. Mechanizmy zakrzepicy tętniczej i żyłnej są odmienne, bowiem wynikają z innego rodzaju zaburzeń hemostazy. Fakt ten sprawia, że obecnie powinniśmy mieć inne spojrzenie na patogenezę, diagnostykę i prewencję choroby zakrzepowej toczącej się w łożysku naczyń tętniczych i żylnych.

Zakrzepica odgrywa kluczową rolę w patogenezie i progresji zarówno chorób sercowo-naczyniowych rozwijających się na tle miażdżycy, m. in. choroba niedokrwienna serca i mózgu, jak i żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Choroba zakrzepowa naczyń żylnych przebiega najczęściej pod postacią nawracającego zapalenia żył głębokich kończyn dolnych i powierzchwniowych, rzadziej jako zatorowość płucna.

*Artykuł w pełnej wersji do pobrania w pliku pdf.*

[06\\_Problemy\\_chorob\\_zakrzepowo-zatorowych.pdfDownload](#)