

# ZMIANY GĘSTOŚCI MINERALNEJ W DYSTALNYM ODCINKU KOŚCI PROMIENIOWEJ W PRZEBIEGU REUMATOIDALNEGO [...]

II Krakowskie Sympozjum – Osteoporoza w życiu, praktyce i teorii

Kraków 30.09 – 01.10.1995

Streszczenia:

Materiały kongresowe: REFERATY, s7.

## ZMIANY GĘSTOŚCI MINERALNEJ W DYSTALNYM ODCINKU KOŚCI PROMIENIOWEJ W PRZEBIEGU REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW

Doniesienie wstępne

J. Bucka<sup>1</sup>, E. Czerwiński<sup>2</sup>, R.T. Kukiełka<sup>2</sup>

*1 Krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji, Kraków Al. Focha 33,*

*2 Klinika Ortopedii CMUJ*

Celem badań była ocena zmian gęstości mineralnej kości u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Przebadano 50 chorych leczonych w Krakowskim Szpitalu Reumatologii i Rehabilitacji z klasycznym lub pewnym reumatoidalnym zapaleniem stawów wg kryteriów ARA. Wiek chorych wahat się od 21-79 lat, średnio 50 lat. W grupie tej było 46 – kobiet (92 %) i 4 – mężczyzn (8 %).

Oprócz typowych badań klinicznych u wszystkich wykonano oznaczenie gęstości mineralnej kości promieniowej aparatem Osteometer 100 (Single SXA). Poddano analizom gęstość minerałów w odcinku Distal i Ultradistal kości promieniowej.

Chorych podzielono na cztery grupy wg stopnia zaawansowania zmian radiologicznych. W poszczególnych grupach zaawansowania RZS było: I-16 %, II – 30 %, III -30%, IV – 24 % chorych.

Leczenie sterydami stosowano u 20 chorych (40%).

Stwierdzono stopniowe zmniejszanie gęstości minerałów w dalszym odcinku kości promieniowej w grupach o wyższym stopniu zaawansowania RZS. Wyniki analiz wskazują, że u osób z RZS ubytek gęstości mineralnej przebiega szybciej w kości gąbczastej niż korowej.