

# Twardzina układowa – możliwości leczenia

Terapia 5/2004. Reumatologia.

Lek. med. Honorata Pietrzak- Kaczmarek

*Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna  
i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu*

*Kierownik:*

*prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska*

Twardzina układowa (TU) jest układową chorobą tkanki łącznej o charakterze postępującym, toczącą się w obrębie skóry, tkanki podskórnej, układu kostno-stawowego oraz narządów wewnętrznych. Etiologia choroby nie jest znana. Bierze się pod uwagę tło genetyczne – związek z występowaniem antygenów zgodności tkankowej HLA – B8, DR3, DR 5 oraz Bw52, DR2, DR 4, a także działanie takich związków chemicznych, jak chlorek winylu, toluen, benzen, silikon, niektóre leki (bleomycyna, pentazocyna, L- tryptofan) (1).

TU występuje częściej u kobiet niż mężczyzn (3:1), dotyka zwykle osoby między 35 a 64 rokiem życia (2).

*Artykuł w pełnej wersji do pobrania w pliku pdf*

[05\\_Twardzina\\_układowa.pdfDownload](#)