

W jaki sposób zapobiegać złamaniom osteoporotycznym? – publikacje w systemie Open Access

W załączeniu prezentujemy kilka publikacji Osteoporosis International z 2015, dostępnych nieodpłatnie dla zainteresowanych czytelników.

O tym, że implementacja Fracture Liaison Services może pozytywnie wpłynąć na trend złamań osteoporotycznych pisze zespół Nakayama et al. przedstawiając wyniki mówiące o ok 40% redukcji głównych złamań osteoporotycznych – [więcej](#)

Potwierdzenie teorii o wpływie i kosztoskrotywności suplementacji wit D i wapnia na redukcję liczby złamań niskoenergetycznych szukały zespoły [Ethgen et al.](#) (analiza kosztoskrotywności) oraz [Weaver et al.](#) (metaanaliza).

Modele prewencji wtórnej, przedstawione przez specjalistów, w dziedzinie walki ze złamaniami wtórnymi po pierwotnym złamaniu bliższego końca kości udowej, zaprezentowano w pracy [Drew et al.](#)

O tym jak zmieniło się prawdopodobieństwo otrzymania leczenia na osteoporozę po złamaniu bliższego końca kości udowej w Wielkiej Brytanii na przestrzeni 10 lat (2000-2010), również w wyniku wprowadzenia w wielu ośrodkach systemu opartego na koordynatorze, pisze zespół [Klop et al.](#)